

Infektionskrankheiten in Gemeinschaftseinrichtungen

Merkblatt

Stomatitis aphthosa (Herpes simplex Typ 1)

Bei der Stomatitis aphthosa sind meist Zunge, Lippe und Schleimhaut des weichen Gaumens befallen, „Bläschen im Mund Krankheit“. Die Kinder fiebern, haben Schmerzen im Mund und verweigern das Essen. Durch den Speichelfluss und das Fingerlutschen ist eine Verschleppung der Herpesviren an andere Orte möglich.

<u>Erreger:</u>	Herpes simplex Virus Typ 1.
<u>Übertragung:</u>	Tröpfchen- und Schmierinfektion, direkter Kontakt und Weiterverbreitung auf die umgebenden Zellen.
<u>Inkubationszeit:</u> (Zeit zwischen Ansteckung und dem Auftreten erster Krankheitszeichen)	Wenige Tage.
<u>Dauer der Ansteckungsfähigkeit:</u>	10 - 14 Tage bei direktem Kontakt mit den Bläschen.
<u>Verhalten:</u>	Keine Meldepflicht an das Gesundheitsamt. Kinder mit ausgeprägter Stomatitis aphthosa sollten dem Kindergarten/der Schule fernbleiben. Bei geringem Krankheitsbild kein Ausschluss aus der Gemeinschaftseinrichtung erforderlich.
<u>Wiedenzulassung:</u>	Nach Abheilung der Bläschen.
<u>Ausschluß von Ausscheidern:</u>	Entfällt.
<u>Ausschluß von Kontaktpersonen:</u>	Nicht erforderlich.
<u>Besondere Hygienemaßnahmen:</u>	Kontaktpersonen müssen sorgfältige Händehygiene vornehmen. Vermeiden des direkten Kontaktes mit den infizierten Stellen des Kranken.
<u>Medikamentöse Vorbeugung:</u>	Eventuell Virusstatika lokal.
<u>Schutzimpfung:</u>	Nicht vorhanden.